



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΠΟΙΟΤΙΚ. & ΦΥΤΟΪΓ. ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ι. Μυλωνόπουλος, Κ. Τζουβάρας
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2321355224, 2321355220
E-mail: milonopoulos@serres.pkm.gov.gr
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Τέρμα Ομονοίας-Τ.Κ. 62125

Σέρρες : 16/10/2024
Αριθμ. Πρωτ.: 724458(26578)

ΠΡΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

**6^ο ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ**

	Στόχοι
1.1	Το παρόν Δελτίο εκδίδεται από τη Δ.Α.Ο.Κ. Σερρών σε συνεργασία με το Π.Κ.Π.Φ.Π. & Φ.Ε. Καβάλας και απευθύνεται στους παραγωγούς της ΠΕ Σερρών για την ενημέρωσή τους σχετικά με την εφαρμογή της κατάλληλων καλλιεργητικών πρακτικών στη καλλιέργεια του βαμβακιού.
1.2	Αφορά στο διάστημα μετά τη συγκομιδή και αποσκοπεί στην κατάλληλη διαχείριση της βαμβακοκαλλιέργειας με στόχο την αποτελεσματική φυτοπροστασία την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.
1.3	Προϋπόθεση επιτυχούς φυτοπροστασίας είναι ο καλλιεργητής να εφαρμόζει τις κατάλληλες καλλιεργητικές πρακτικές μετά τη συγκομιδή που βιοηθούν στη μείωση του πληθυσμού των διαχειμαζόντων επιβλαβών οργανισμών όπως αποτυπώνονται στον σχετικό οδηγό.
2.	Διαπιστώσεις
2.1	Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν βοήθησαν στην ομαλή ωρίμανση – αποφύλλωση των βαμβακοφυτειών, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ομαλά η συγκομιδή στα τέλη Σεπτεμβρίου – αρχές Οκτωβρίου.
2.2	Δεν διαπιστώνεται σημαντικό πρόβλημα προσβολών των καψών από εχθρούς ή/και ασθένειες με εξαίρεση ορισμένες υγρές περιοχές, όπου διαπιστώνονται μέτρια ποσοστά σήψεων των κατώτερων καψών όψιμων ποικιλίων - υβριδίων από προσβολές μυκήτων των γενών Fusarium sp., Alternaria sp. και Cylindrosporium sp., χωρίς όμως να εντοπίζονται σημεία προηγούμενης εντομολογικής προσβολής. Επίσης, εντοπίστηκε σε μία περιοχή όπου δεν υπήρχε παγίδα της υπηρεσίας μας, προσβολή των πράσινων καψών της κορυφής από ρόδινο σκουλήκι. Οι συγκεκριμένοι αγροί είχαν όψιμες ποικιλίες - υβρίδια και χαρακτηρίζονταν από πλούσια βλάστηση που διατηρήθηκε μέχρι το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου.
3.	Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές
3.1	Καλούνται οι καλλιεργητές να εφαρμόζουν υποχρεωτικά, μετά τη συγκομιδή και όταν το επιτρέπουν οι εδαφοκλιματικές συνθήκες κάθε αγρού, στελεχοκοπή, ψιλοθρυματισμό των υπολειμμάτων των βαμβακοφύτων και ενσωμάτωση αυτών με όργωμα με υνιοφόρο αλέτρι σε βάθος 20-25 cm. Οι παραπάνω καλλιεργητικές εργασίες περιλαμβάνονται στις υποχρεωτικές

	αρχές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας της καλλιέργειας βαμβακιού σύμφωνα με τον Ν. 4036/2012. Με τις παραπάνω καλλιεργητικές εργασίες επιτυγχάνεται καταστροφή μεγάλου πληθυσμού των προς διαχείμαση νυμφών του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού και μολυσμάτων διάφορων παρασιτικών ασθενειών.
3.2	Συνιστάται στους καλλιεργητές βάμβακος, χωρίς να είναι υποχρεωτικό , η σπορά ψυχανθούς/βίκου ως ενδιάμεσης χειμερινής καλλιέργειας και στη συνέχεια η ανοιξιάτικη ενσωμάτωση της χλωρομάζας σε ελαφρά πρώιμα εδάφη ή η κοπή της χλωρομάζας για χρήση της ως ζωοτροφή και ενσωμάτωση μόνο του ριζικού συστήματος Με αυτό τον τρόπο διευκολύνεται η προετοιμασία του χωραφιού για έγκαιρη σπορά και βελτιώνεται η δομική και βιολογική γονιμότητα του εδάφους η οποία συμβάλλει τόσο στην πρωίμηση της καλλιέργειας όσο στην αύξηση της παραγωγής και τη βελτίωση της ποιότητάς της.



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ:

1. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Καβάλας, Άγ. Λουκάς – Τέρμα Αμυνταίου, Τ.Θ. 1235, 651 10 ΚΑΒΑΛΑ
2. Γραφείο Τύπου Π.Ε. Σερρών (με την παράκληση να προωθηθεί στα τοπικά Μ.Μ.Ε.)
3. Καταστήματα Γεωργικών φαρμάκων Π.Ε. Σερρών
4. Δήμοι Π.Ε. Σερρών

ΚΟΙΝ.: Γενική Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Κ.Μ